

Cómo tomar Varisag600TM

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médica o farmacéutica.
- **Este medicamento se le ha recetado a Vd. o a sus dependientes y debe haber sido obtenido por los canales legales. No nos hacemos responsables de medicamentos obtenidos ilegalmente o de la discontinuidad en el uso de Varisag 600mgTM. La piratería farmacéutica es un delito contra la salud pública.**

En este prospecto:

1. Qué es **Varisag 600mgTM** Comprimidos recubiertos y para qué se utiliza: Este medicamento está recomendado para tratar el virus VCA en niños y adultos.

2. Antes de tomar **Varisag 600mgTM**: **asegúrese de que el medicamento se obtuvo de manera legal, en una farmacia con licencia de la Gran Unión y aprobada por el Brazo de la Salud.**

3. Cómo tomar **Varisag 600mgTM**: Se recomienda un comprimido diario, en una sola toma durante la comida o la cena. Si los síntomas se vuelven graves es posible que su médica recomiende aumentar la dosis. Si la paciente es crónica y el virus es indetectable en sangre se puede recomendar medio comprimido como mantenimiento.

4. Posibles efectos adversos: Mareos, náuseas, sequedad de las mucosas, fiebre moderada, dolor de cabeza, pérdida de sensibilidad sensorial (vista nublada o pérdida de audición).

Composición:

- El principio activo es Varisag. Cada comprimido recubierto contiene 600 mg de Varisag (D.O.E.).
- Los demás componentes son: celulosa en polvo, lactosa monohidrato, croscarmelosa de sodio, sílice coloidal anhidra, estearato de magnesio, hipromelosa, dióxido de titanio, polietilenglicol, polisorbato 80 y emulsión de ceras en base acuosa.

Titular y fabricante:



Laboratorios Hygea Inc.
(Ciudad-estado de Macedonia)
@hygealabs